

CONSENSO INFORMATO DEL PAZIENTE PER L'IMPIANTO RISSORBIBILE DI ACIDO IALURONICO:

ALIAXIN®GP Global Performance, ALIAXIN®SR Shape & Restore, ALIAXIN®FL Fine

Lines, ALIAXIN®LV Lip Volume, ALIAXIN®EV Essential Volume, ALIAXIN®SV Superior Volume,

Profilo®, Profhilo® Body, Profhilo® Structura, Viscoderm®, Viscoderm® Skinkò, Viscoderm® SkinkòE, e Viscoderm®

Hydrobooster

Con la presente dichiaro che mi sono stati debitamente spiegati e illustrati l'utilizzo, le indicazioni, le controindicazioni, gli eventuali effetti indesiderati e complicanze relativi all'impiego degli impianti della gamma ALIAXIN®, PROFHILO® e VISCODERM®.

Ho risposto in tutta sincerità all'insieme delle domande che mi sono state poste relativamente ai miei precedenti trattamenti medici ed estetici. Ho avuto modo di porre tutti gli interrogativi che volevo e mi sono state fornite risposte soddisfacenti ed esaurienti.

Ho ben compreso che:

- Questi prodotti sono dei gel trasparenti bio-riassorbibili di acido ialuronico di origine non animale.
- Questi prodotti vengono iniettati per il trattamento delle depressioni cutanee o per migliorare l'idratazione e l'elasticità cutanea.
- La durata dell'efficacia dei prodotti può variare in funzione del tipo di pelle, dello stress ossidativo, delle zone di trattamento, delle quantità iniettate e della tecnica di iniezione.

EFFETTI INDESIDERATI ED EVENTUALI COMPLICANZE

Ho preso anche buona nota che dopo il trattamento con, per:

- ☐ il riempimento delle rughe frontali ☐ per il contorno labbra
- ☐ il riempimento delle rughe della glabella ☐ il riempimento delle rughe periorali
- ☐ il riempimento dei solchi nasogenieni ☐ il trattamento delle rughe del collo
- ☐ il riempimento delle commessure labiali ☐ il trattamento idratante della cute
- ☐ il riempimento dei solchi nasogenieni profondi ☐ l'aumento dei contorni del viso
- ☐ l'aumento del volume degli zigomi e delle guance ☐ il trattamento dell'area malare/submalare
- ☐ il trattamento delle aree dinamiche del volto
- ☐ il trattamento della lassità corpo

Possono sopravvenire, successivamente all'iniezione, delle reazioni infiammatorie, quali rossore, edema, eritema..., che possono essere associate a irritazioni o a dolori da pressione. Queste reazioni possono persistere per 7/10 giorni. Nel punto d'iniezione possono apparire degli indurimenti dei tessuti o dei noduli. Sono stati descritti in letteratura dei casi molto rari di colorazione della zona d'iniezione. Sono stato ugualmente informato/a di rari casi di necrosi della regione glabellare, di ascessi, di granulomi e di ipersensibilità, che sono stati descritti in letteratura, dopo iniezioni di acido ialuronico.

La persistenza delle reazioni infiammatorie, oltre il periodo di 7/10 giorni, deve essere segnalata al medico nel minor tempo possibile. Il medico dovrà rimediare per mezzo di un trattamento appropriato. In tutti i casi, per risolvere questi effetti secondari, può rendersi necessario un trattamento che può durare diversi mesi.

Dichiaro altresì di avere preso conoscenza delle raccomandazioni da seguire nel periodo post-iniezione e mi impegno a seguirle correttamente.

Avendo ben compreso ogni chiarimento ed essendo stato correttamente informato, nei tempi dovuti, dei possibili vantaggi che possono derivare da tale metodica e degli eventuali effetti collaterali e delle eventuali sequele che ne possono derivare, ho deciso di sottopormi a tale metodica e dò il mio consenso e pieno mandato al Dr. _____

.

Nome e cognome del paziente

Nome e cognome del medico

(in stampatello)

(in stampatello)

.....

.....

Data e firma del paziente

Data e firma del medico

.....

.....